

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

VILZER VILDAGLIPTINA 50 mg Comprimidos

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Contenido del prospecto:

- 1-¿Qué es Vildagliptina y para qué se utiliza?
- 2- Antes de tomar Vildagliptina
- 3-¿Cómo tomar Vildagliptina?
- 4- Posibles eventos adversos
- 5- Conservación del envase 6- Información adicional

1-¿QUÉ ES VILDAGLIPTINA Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

El principio activo de vildagliptina pertenece a un grupo de medicamentos llamados “antidiabéticos orales”.

Vildagliptina se utiliza para tratar pacientes adultos con diabetes tipo 2 cuando la diabetes no puede controlarse únicamente por la dieta y el ejercicio. Ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre.

Su médico le recetará vildagliptina solo o en combinación con otros medicamentos antidiabéticos que ya esté tomando si estos no son lo suficientemente efectivos para controlar la diabetes.

Aunque empiece a tomar este medicamento para su diabetes, es importante que continúe con la dieta y/o ejercicio que le hayan recomendado.

2- ANTES DE TOMAR VILDAGLIPTINA

No tome VILDAGLIPTINA

- Si es alérgico a vildagliptina o a alguno de los demás componentes de este medicamento.

Tenga especial cuidado:

Debe consultar con su médico antes de empezar a tomar vildagliptina:

- Si padece diabetes tipo 1 (es decir, su organismo no produce insulina) o si padece una situación llamada cetoacidosis diabética.
- Si está tomando un medicamento antidiabético conocido como una sulfonilurea.
- Si padece una enfermedad moderada o grave del riñón.
- Si se está sometiendo a diálisis.
- Si padece una enfermedad del hígado.
- Si padece insuficiencia cardíaca.
- Si tiene o ha tenido una enfermedad del páncreas

Si ha tomado anteriormente vildagliptina, pero ha tenido que dejar de tomarla debido a una enfermedad del hígado, no debe tomar este medicamento.

Las lesiones de la piel son complicaciones frecuentes de la diabetes. Siga las recomendaciones de su médico para el cuidado de la piel y de los pies, prestando especial atención a la aparición de ampollas o úlceras mientras esté tomando vildagliptina. Si esto ocurre, debe consultar lo antes posible a su médico.

Debe realizarse pruebas de la función del hígado antes de iniciar el tratamiento con vildagliptina, a intervalos de tres meses durante el primer año y después de forma periódica. Esto se realiza para detectar lo antes posible cualquier signo que indique un aumento en las enzimas hepáticas (transaminasas).

Tenga en cuenta que:

La administración de vildagliptina no está recomendada en niños y adolescentes menores de 18 años.

Debe informar a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos con o sin receta, suplementos vitamínicos o productos naturales.

Su médico puede cambiar su dosis de vildagliptina si está tomando otros medicamentos tales como:

- Tiazidas u otros diuréticos.
- Corticosteroides.
- Medicamentos para la tiroides.
- Ciertos medicamentos que afectan al sistema nervioso.

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedar embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No debe utilizar vildagliptina durante el embarazo.

Se desconoce si vildagliptina pasa a la leche materna. No debe tomar vildagliptina si está dando el pecho o planea darlo.

Si se siente mareado mientras toma vildagliptina, no conduzca o maneje herramientas o máquinas.

Vildagliptina contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3- ¿CÓMO TOMAR VILDAGLIPTINA?

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico.

La dosis de vildagliptina que debe tomar cada persona varía, dependiendo de su estado. Su médico le indicará exactamente el número de comprimidos de vildagliptina que debe tomar. La dosis diaria máxima es de 100 mg.

Trague el comprimido entero con un poco de agua. Tome vildagliptina cada día mientras su médico se lo indique. Puede que tenga que seguir este tratamiento durante un largo periodo de tiempo.

Su médico le realizará controles periódicos para comprobar que el tratamiento ejerce el efecto deseado.

Si olvidó tomar VILDAGLIPTINA:

Si se olvida de tomar una dosis de este medicamento, tómela en cuanto se acuerde. Luego tome la siguiente dosis a su hora habitual. Si ya es casi la hora de la siguiente dosis, sátese la dosis olvidada.

No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con VILDAGLIPTINA:

No deje de tomar vildagliptina a no ser que su médico se lo indique. Si tiene dudas acerca de la duración del tratamiento con vildagliptina, consulte a su médico.

Si tomó más VILDAGLIPTINA del que debe:

Si ha tomado demasiados comprimidos de Vildagliptina, o si otra persona ha tomado su medicamento, consulte a su médico inmediatamente. Puede necesitar atención médica. Si ha de visitar a su médico o ir al hospital más próximo, lleve consigo el envase.

4- POSIBLES EFECTOS ADVERSOS:

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Algunos síntomas exigen atención médica inmediata:

Debe dejar de tomar vildagliptina y acudir a su médico inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos:

- **Angioedema:** Síntomas que incluyen cara, lengua o garganta hinchadas, dificultad al tragar, dificultad al respirar, aparición repentina de sarpullido o urticaria, que pueden ser indicativos de una reacción llamada “angioedema”.
- **Enfermedad del hígado (hepatitis):** Síntomas que incluyen coloración amarillenta de la piel y ojos, náuseas, pérdida de apetito o coloración oscura de la orina, que pueden ser indicativos de una enfermedad del hígado.
- **Inflamación del páncreas (pancreatitis):** Síntomas que incluyen dolor intenso y persistente en el abdomen (área del estómago), que puede llegar hasta su espalda, así como náuseas y vómitos.

Otros efectos adversos que pueden aparecer mientras toma vildagliptina sola o en combinación con otros medicamentos para su diabetes:

- **Los efectos que pueden aparecer frecuentemente son:**
- Temblor, dolor de cabeza, mareos, debilidad, disminución de la glucosa en sangre (hipoglucemia), aumento de peso, manos, tobillos o pies hinchados (edema), sudoración excesiva, escalofríos, náuseas (malestar), ardor de estómago.
- **Con poca frecuencia pueden aparecer:**
- *Fatiga, constipación, diarrea, flatulencia, dolor en las articulaciones.*
- **Muy raramente pueden aparecer:**
- Dolor de garganta, congestión nasal, fiebre.
- **También pueden aparecer, aunque no se conoce su frecuencia:**
- *Erupción con picazón, inflamación del páncreas, descamación localizada de la piel o ampollas, dolor muscular.*

5- CONSERVACIÓN DEL ENVASE:

Almacenar a temperatura no mayor de 30° C.

6- INFORMACIÓN ADICIONAL:

El principio activo es vildagliptina.

Los demás componentes son: lactosa monohidrato, celulosa microcristalina, almidón glicolato de sodio y estearato de magnesio.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.

Mayor información en www.ispch.cl